

BULLETIN
DES SCIENCES NATURELLES
ET DE GÉOLOGIE.

DEUXIÈME SECTION

DU

BULLETIN UNIVERSEL DES SCIENCES
ET DE L'INDUSTRIE,

PUBLIÉ

SOUS LA DIRECTION DE M. LE BON. DE FÉRUSSAC,

OFFICIER SUPÉRIEUR AU CORPS ROYAL D'ÉTAT-MAJOR,

CHEVALIER DE SAINT-LOUIS ET DE LA LÉGION-D'HONNEUR,

NOMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES NATIONALES ET ÉTRANGÈRES.

TOME PREMIER.



A PARIS,

AU BUREAU DU BULLETIN, rue de l'Abbaye, n^o. 3 ;

Chez MM. TREUTTEL et WÜRTZ, rue de Bourbon, n^o. 17 ; et
même maison de commerce : à Strasbourg, rue des Serruriers ;
à Londres, 30, Soho-Square ;

Chez MM. DUFOUR et D'OCAGNE, quai Voltaire, n^o. 13 ; et même
maison de commerce, à Amsterdam ;

Et chez M. LEVRAULT, rue des Fossés-M.-le-Prince, n^o. 31.

1824.

Perroquet Kakatoe rosalbin ; *Psittacus Cos.* (Kuhl.) Nouv.-Holl. — Pl. 82. Caille à ventre perlé, mâle, *Perdix striata.* (Lath.) Madagascar. — Pl. 83. Hirondelle longipenne, *Hirundo longipennis.* (Reinw.) Java. — Hirondelle orientale, *Hirundo javanica.* (Lath.) Moluques et Java. — Pl. 84. Sonimanga à long bec, *Nectarinia longirostra.* (Reinw.) Java. — Sonimanga modeste, *Nectarinia inornata.* (Temme.) Moluques.

XVe. livraison. — Pl. 85. Milan Riocour, adulte ; *Falco Riocourii.* (Vieill.) Sénégal. — Pl. 86. Autour à gros bec, jeune ; *Falco magnirostris hornotinus.* Brésil. — Pl. 87. Autour multi-raie, mâle, adulte ; *Falco striolatus.* (Temme.) Guiane. — Pl. 88. Crinon barbu, mâle ; *Criniger barbatus.* (Temme.) Afrique. — Pl. 89. Barbu souci-col, mâle ; *Bucco armillaris.* (Temme.) Java. — Barbu gorge-bleue, mâle ; *Bucco gularis.* (Reinw.) Java. — Pl. 90. Pic trapu, mâle et femelle ; *Picus concretus.* (Reinw.) Java. Q.-Y.

130. HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DE L'ALLEMAGNE (NOUV. édit. en allemand) ; par J. A. NAUMANN ; publiée par livr., form. gr. in-8, av. pl. col. Chez Fleischer, à Leipsig.

Il a déjà paru, de cet ouvrage, trois parties contenant 93 pl., dont le prix total est de 55 rixthalers, et l'on promet que l'ouvrage sera promptement terminé. Pour en faciliter l'acquisition, l'éditeur propose de le diviser en livraisons du prix de 2 à 4 rixthalers, que l'on pourra prendre successivement. (*Gazette littér. d'Iéna*, sept. 1823.)

131. THE BRITISH WARBLERS, containing six beautifully coloured figures of the most interesting birds of passage, belonging to the genus *Sylvia* ; by R. SWEET. Prix, 7 sh. 6 d. (*Bibl. du Roy. des Pays-Bas*, n°. d'oct. 1823.)

Cerécueil, de 6 pl. exécutées avec luxe, est destiné à représenter les oiseaux chanteurs de la Grande-Bretagne, qui sont tous de passage, et qui appartiennent au genre *Sylvia* de Linn.

132. DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE TORTUE et de trois espèces nouvelles de SCINQUES, rapportées par MM. QUOY et GAIMARD ; mémoire lu à la Soc. d'hist. nat. de Paris, le 7 nov. 1823, par M. Gaimard, memb. corresp. de cette Soc., etc.

Tortue noire. *Testudo californiana*, Quoy et Gaim. — Caract. essen. *Testudo toto corpore nigro ; testâ gibbâ ; scutellis*

dorsalibus priori posteriorique elevatis; lorice cunctis margine striatis; lateribus subcarinatis. — *Dimensions.* Largeur de la carapace, 1 pi. 3 lignes; longueur, 1 pi.; circonférence, 2 pi. 5 po.; longueur du plastron, 9 po. 1 ligne; largeur, 7 po. 3 lignes. — *Patrie.* La Californie. Cette tortue fut donnée vivante aux îles Sandwich à M. de Freycinet, par un capitaine américain.

Scinque jaune et noir. *Scincus nigro-luteus*; Quoy et Gaim. — *Caract. essent.* *Scincus corpore nigro, luteo variegato; pedibus æqualibus; digitibus illis hominis similibus; caudâ tereti apice obtusâ.* — *Dimensions.* Longueur du bout du museau à l'anus, 9 po.; longueur de la queue, 5 po. — *Patrie.* La Nouvelle-Galles du sud, au delà des montagnes Bleues.

Scinque à flanes noirs. *Scincus vittatus*, Quoy et Gaim. — *Caract. essent.* *Scincus suprâ fuscus, subtus albus; vittâ laterali nigrâ; digito posteriori penultimo longiore; caudâ quadrangulatâ, squammarum duabus seriebus distinctâ.* — *Dimensions.* Longueur du bout du museau à l'anus, 3 po. 2 lignes. — *Patrie.* La Nouvelle-Galles du sud, rade de Sydney.

Scinque à queue comprimée. *Scincus Compressicauda*, Quoy et Gaim. — *Caract. essent.* *Scincus caudâ compressâ, corpore longiore; lineâ subalbâ longitudinali, suprâ dorsum, duabus nigricantibus comitatâ.* — *Dimens.* Longueur du bout du museau à l'anus, 3 po. 2 lignes; longueur de la queue, 6 po. 9 lignes. — *Patrie.* La Nouvelle-Galles du sud, au-delà des montagnes Bleues.

DESM.

133. SUR DES REPTILES OBSERVÉS A LA MÉNAGERIE DE VIENNE; par M. FITZINGER. (*Arch. für Geschicht, etc. Vienne, 1823, n.º 59.*)

Cet établissement possédait dernièrement un grand nombre de reptiles exotiques vivans, parmi lesquels on cite celui que l'auteur de l'article a nommé *Caretta virgata* (*Chelonia virgata* de Duméril), venant de Saint-Domingue; le *Testudo marginata* de Schöpfung, venant d'Égypte; le *Testudo madagascariensis*, Commerson; le *Testudo Schweigeri* de l'auteur, la plus grande tortue de terre que l'on connaisse (apportée du Brésil); le *Crocodylus acutus*, amené de Saint-Domingue; le *Crocodylus Sclerops* Schn., du Brésil; le *Chamaeleo Africanus* Laur. d'Égypte.

Mais ce qui est encore plus remarquable, ce sont un *Boa Jactus* et une *Vipera cerastes* vivans, venant d'Égypte, qui ont sur le cou une longue crinière qu'avec un peu d'attention on